

SEACTIV Vital

Výrobce: Timac Agro S.A.S. 27 avenue Franklin Roosevelt, BP 70158, 35408 Saint-Malo, France

Dovozce: TIMAC AGRO CZECH s.r.o. U nákladového nádraží 3147/8a, 130 00 Praha 3 - Strašnice; registration@cz.timacagro.com, tel: +420 567 301 995

Číslo rozhodnutí o registraci: 5095

Chemická a fyzikální vlastnost:

Chemická a fyzikální vlastnost	Hodnota
Celkový dusík (N)	9 %
Močovinový dusík (N)	9 %
Vodorozpustný oxid fosforečný (P ₂ O ₅)	5 %
Vodorozpustný oxid draselný (K ₂ O)	4 %
Vodorozpustný bor (B)	0,05 %
Vodorozpustná měď (Cu)	0,02 %
Vodorozpustné železo (Fe)	0,02 %
Vodorozpustný mangan (Mn)	0,10 %
Vodorozpustný molybden (Mo)	0,01 %
Vodorozpustný zinek (Zn)	0,05 %
pH	5 - 6

Hnojivo obsahuje stimulátor biologických procesů Seactiv komplex (výtažek z mořských řas, rostlinné výtažky)

Hnojivo s nízkým obsahem chloru.

Obsah rizikových prvků

splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P₂O₅, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 20, chrom 150.

Rozsah a způsob použití

Hnojivo se používá ve formě postřiku. V zelinářství, ovocnářství, vinohradnictví a okrasném zahradnictví je nejvhodnější pravidelné přihnojování postřikem vícekrát za vegetaci v intervalu 10-14 dní. Přihnojovat začínáme po vytvoření dostatečné listové plochy. Hnojení končíme 2-3 týdny před sběrem. Ve vytrvalých kulturách končíme s hnojením v červenci-srpnu. Postřik provádíme časně ráno nebo v podvečer.

Doporučené dávkování

Plodina	Počet aplikací	Aplikace ve vývojovém stadiu	Dávka 1 / ha	Ředění
Obilniny	1	Objevení se jazýčku posledního listu	3-5	150-300
Vinohrady	4-6	Začátek růstu plodů Každých 15 dní	5 5	400-1000 400-1000
Sady	4-6	Začátek růstu plodů Každých 15 dní	5 5	400-1000 400-1000
Rajčata, Lilek, Okurky Cukety, Sladká paprika, Melouny	1-4	Vývoj rostlin Každých 15 dní	5 5	300-1000 300-1000

Salát, čekanka	1-4	Vývoj rostlin Každých 15 dní	3 3	300-1000 300-1000
Cibule, Česnek	1-4	Vývoj rostlin Každých 15 dní	5 5	400-1000 400-1000
Řepka ozimá	1-2	Opad korunních lístků	4	150-500
Jahody	1-4	Vývoj rostlina a vytváření plodů	3-5	300-1000
Květák	1-4	Vývoj rostlin Každých 15 dní	5	400-1000
Řepka ozimá	1	Opad korunních lístků	4	150-300
Kukuřice	1	6-8 listů	3-5	150-300

Toto doporučení je pouze informativní. Je potřebné ho uzpůsobit vývojovému stádiu plodiny, půdnímu druhu a povětrnostním podmínkám.
Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

Prohlášení o produktu:

-Stimuluje fotosyntézu

-Zlepšete výnos a kvalitu plodin, zvyšte příjem živin rostlinami

-Zlepšuje asimilaci živin a vody, aby byla zajištěna lepší odolnost vůči abiotickému stresu

ŘEDĚNÍ: Nalijte SEACTIV Vital do nádrže aplikačního zařízení z poloviny naplněného vodou a dobře promíchejte. Poté doplňte nádrž postřikovače vodou na stanovený objem. Míchejte během celé aplikace. Doporučené minimální ředění je 1% maximum, od 150 l/ha do 1000 l/ha. Před nanesením na list jemně protřepejte. Neaplikujte v období mrazů. V teplém počasí aplikujte brzo ráno nebo později večer.

MÍCHATELNOST: SEACTIV Vital je kompatibilní s mnoha chemickými látkami. V každém případě snášlivost před použitím vyzkoušejte. Odpovědnost výrobce je omezena na záruku složení výrobku uvedeného na etiketě v originálním balení.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ: Skladujte mimo přímé sluneční světlo a vysoké teploty. Skladujte ve větrané, čisté a suché místnosti. Minimální skladovací teplota: 0 °C

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Hmotnost, balení

Netto váha: 11,6 kg Netto Objem: 10 l

Číslo výrobní šarže

na obalu

Datum výroby

na obalu

Hustota: 1,16

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Varování



H319: Způsobuje vážné podráždění očí. P280: Používejte obličejový štít, ochranné rukavice. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 +P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.